

Febernedsættende medicin til børn.

Ved febernedsættende medicin forstås i denne sammenhæng smertestillende medicin f.eks. paracetamol.

Børn der måtte have brug for febernedsættende medicin, må ikke komme i pasning.

Børn bør generelt ikke få febernedsættende medicin, da det kan sløre barnets sygdomssymptomer. Er barnet alment påvirket med feber bør det ikke have febernedsættende medicin før det er blevet vurderet af en læge.

Nedenfor gengives forskellige offentlige instansers udmeldelse om brug af febernedsættende medicin til børn.

Sundhedsstyrelsen skriver i Sunde Børn, 2009 s. 105:

”Smertestillende medicin sænker temperaturen kunstigt og kan være farlig for barnet, da medicinen kan sløre barnets sygdomssymptomer”

Sundhedsstyrelsen skriver i Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre, 1996 s. 12 (stadig den aktuelle):

”Der er kun sjældent grund til at give et barn febernedsættende medicin, og man bør forinden have drøftet dette med lægen. Børn under 1 år bør sædvanligvis ikke få febernedsættende medicin”.

Lægemiddelstyrelsen oplyser på deres hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk at børn under 16 år ikke må få acetylsalicylsyre, da der i sjældne tilfælde er set udvikling af Reyes syndrom i forbindelse med indtagelse af acetylsalicylsyre.

De skriver endvidere at febernedsættende medicin ikke anbefales til børn der tidligere har haft feberkramper, på grund af risikoen for at fremkalde feberkramper igen.

Månedsskrift for praktisk lægegerning, december 2009, kan ikke anbefale at give paracetamol til børn efter vaccinationer, da det har vist, at børnene danner betydelig mindre antistoffer efter indgift af paracetamol.

Den Kommunale Sundhedstjeneste, 2010.